



Zwangerschap met maternale leeftijd ≥ 40 jaar

Definitie

Peildatum leeftijd: maternale leeftijd bij intake ³ 40 jaar

Doel

Eenduidige uitleg geven mbt wel/geen advies inleiden in a terme periode.

Risicofactoren

- GDM
- PIH
- Obesitas (BMI > 40)
- Dysmaturiteit i.a. (<p10)
- Roken
- Gravida na IVF/ICSI
- Primaire MI

Achtergrondinformatie


Alle zwangeren hebben rond 39 wk AD een (licht) verhoogde kans op een IUVD; voor zowel primiparae als multiparae is er sprake van eenzelfde trend in alle leeftijdsgroepen. In de groep < 35 jaar daalt dit risico weer na 40 weken AD; bij ≥ 40 jaar stijgt dit risico door, maar blijft zeldzaam. NNT = 1:550 ^[1]

Primiparae ≥ 40 jaar hebben een groter risico op een IUVD dan multiparae ≥ 40 jaar (8,65 ‰ vs 3,29 ‰). Multiparae ≥ 40 jaar hebben een lager risico op een IUVD dan primiparae < 35 jaar (3.29‰ vs 3.79‰).

Maternale leeftijd combineren met een andere risicofactor geeft een lage power. ^[2]



Werkwijze / flowchart



Bronvermelding

1. <https://www.vsvhmc.nl/sites/default/files/2019-11/20181107-%20Leidraad%20counseling%20zwangeren%20bij%20gevorderde%20leeftijd.pdf>
2. Goodarzi et al. 2022

Auteurs

Mirjam Oosterhuis, Marianne Gutterswijk-Kabel, Esther Tuinman-Vollaard