

## Behandeling van postpartum atonie en bloeding thuis met Misoprostol

### **Gebruikelijke behandeling eerst**

- placenta geboren laten worden als mogelijk
- oxytocine i.m.
- uterusmassage
- blaas legen
- infuus inbrengen met dikste naald die mogelijk is en voluit vullen met NaCl 0,9% of Voluven of een andere infuusvloeistof maar liever geen glucose oplossingen.
- een andere oorzaak van bloeding dan atonie uitsluiten
- aortacompressie
- spoedtransport regelen en overleg met gynaecoloog

### **Bij atone bloeding:**

**Misoprostol 200 mcg tablet: drie stuks onder de tong eventueel met een lepeltje water.  
Niet doorslikken**

Orale en rectale toediening is ook effectief maar onder de tong geeft de snelste en hoogste piekbloedwaarde

Niet herhalen binnen twee uur

### **Bijwerkingen**

Diarree en buikpijn, misselijkheid, temperatuurstijging, braken, obstipatie, hoofdpijn, duizeligheid en trillen

### **contra-indicatie**

- nog een kind in utero!
- overgevoeligheid voor prostaglandines

Zie ook [www.misoprostol.org](http://www.misoprostol.org)

Controleer houdbaarheidsdatum

Nieuwe tabletten kosteloos verkrijgbaar op WZA afd C0 / kraamafdeling

Zie ook de VSV afspraak Fluxus postpartum in de eerstelijns.